AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 3 - 5 - [illegible]

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"
(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36.01.74

ABONNEMENT ANNUEL : 40 F
Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
C. C. P. RENNES 9404-94 Y

Imprimerie de la station "Bretagne" - Directeur-Gérant : G. CHERBLANC — C P P A P : 528 AD

SUPPLEMENT AU BULLETIN N° 61
(Bulletin céréales n° 6)

30 AVRIL 1982

/B L E/

Stade végétatif moyen : "2 noeuds"

Etat sanitaire :

Le piétin verse a peu évolué depuis une quinzaine de jours. Cette maladie est signalée dans 3 parcelles sur 5, le plus souvent à de faibles niveaux. Le seuil d'intervention (15 à 25 % des talles touchées) est atteint dans 15 % des parcelles. Les attaques sont surtout observées sur Arminda, Corin, Fidel, Top et Talent. Maris Hunstman est généralement indemne.

Sur feuilles, la septoriose est notée dans 4 parcelles sur 5, le maintien d'un temps sec limite, pour le moment, son développement. Des traces d'oïdium sont assez fréquentes sur Arminda. Des cas de rouille jaune ont été enregistrés sur Talent dans le Sud de l'Ille et Vilaine.

Les premiers pucerons ont été signalés sur quelques parcelles.

Préconisations

Effectuer un sondage sur 50 talles dans chaque parcelle.

Un traitement est conseillé au stade 2 noeuds lorsque 15 à 25 % des talles sont touchées par le piétin verse. Si ce seuil n'est pas atteint, attendre le dégagement de la dernière feuille pour lutter éventuellement contre les maladies du feuillage.

Si une intervention est nécessaire au stade actuel, utiliser :

- sur les parcelles à risque élevé ou moyen (plus de 250 plants par m2 ou variétés : Arminda, Corin, Fidel, Talent) un fongicide systémique à large spectre (se reporter au bulletin n° 58 du 17 mars : produits des 2ème et 3ème groupes).

- sur les parcelles à faible risque (moins de 220 plants par m2 ou variété Maris Hunstman) une spécialité à base de carbendazime ou de méthylthiophanate et de manèbe ou de mancozèbe (produits du 1er groupe).

En présence de rouille jaune (situation exceptionnelle) : intervenir dès l'apparition des premiers symptômes avec Tilt C, Vigil K, Bayleton Total ou Corbel + carbendazime.

L'emploi d'un insecticide contre les pucerons ne se justifie en aucun cas.

P.T.
./..

/ORGE D'HIVER/

Stade végétatif moyen : apparition de la dernière feuille.

La rhynchosporiose , présente dans la plupart des cultures, est signalée sur les feuilles supérieures dans 50 % des parcelles. Oïdium et rouille brune sont parfois observés sur les feuilles de la base à de faibles niveaux.

Si cela n'a pas déjà été fait, il est urgent d'intervenir contre la rhynchosporiose :

- sur les parcelles à forte densité de végétation;
- sur les parcelles à potentiel moyen lorsque 50 % des feuilles sont atteintes par la maladie, ou si celle-ci est associée à l'oïdium et à la rouille naine.

Utiliser un fongicide efficace contre ces 3 affections.

Si un traitement a été fait en début de montaison, attendre le gonflement pour juger de l'opportunité d'une nouvelle intervention.

Dernière note : Bulletin n° 5 du 15 avril 1982